

**PREPARAZIONE A TC  
CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO ENDOVENOSO**

(da compilare a cura del Medico prescrittore, barrando ove necessario. Si prega cortesemente di rispondere a tutte le domande indicate)

Il/La Sig/Sig.ra..... ha la necessità di essere sottoposto/a a ..... per la seguente indicazione.....

- la paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta ) o in fase di allattamento

Presenta in anamnesi:

**si no**

- Paraproteinemia di Waldenström  
  Insufficienza epatica grave  
  Insufficienza renale moderata/severa  
  Mieloma multiplo  
  Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria  
  Ipertireosi  
  Diabete in trattamento con Metformina (**deve esser sospesa nei 2 giorni precedenti l'esame e il giorno dell'esame**)  
  È in corso terapia anticoagulante orale

**si no**

- Diatesi allergica**

**IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE**

**Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame con gli esiti recenti (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame) di:**

- **CREATININEMIA**
- **GLICEMIA**

Data .....

Firma del medico di base.....

**N.B.** La TC del torace e dell'addome va effettuata dopo almeno 7 giorni dall' esecuzione di altre indagini contrastografiche (studi radiografici dell'apparato digerente, urografie, interventistica, ecc...) e dopo almeno 2 giorni dalla esecuzione di indagini endoscopiche.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Bergamo</p>	<p><b>ATS DI BERGAMO</b></p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	
--	---	---

## PREPARAZIONE ALL' ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO

Abbondante idratazione (almeno 1.5 litri di acqua) il giorno prima dell'esame.

Digiuno per cibi solidi e liquidi da almeno 4 ore prima dell'esame.

Assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio medico di base, ad esclusione di:

- **Metformina che deve essere sospesa nei due giorni precedenti l'esame, anche il giorno stesso dell'esame;**
- **$\beta$ -bloccanti ed ACE-inibitori che devono essere sospesi il giorno dell'esame (perchè possono aggravare le ipotensioni e rendere inefficace il loro trattamento).**

### NOTA BENE

- si ricorda che **il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare**, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto i farmaci somministrati durante l'esame possono compromettere la guida nelle ore successive l'indagine
- potrebbe essere prevista, dopo l'esame, una permanenza in struttura per almeno 30 minuti.