

 Regione Lombardia ASL Bergamo	ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE	#ABILITA
--	--	-----------------

PREPARAZIONE A TC
CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO ENDOVENOSO

(da compilare a cura del Medico prescrittore, barrando ove necessario. Si prega cortesemente di rispondere a tutte le domande indicate)

Il/La Sig/Sig.ra
 ha la necessità di essere sottoposto/a a
 per la seguente indicazione

La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento: **Sì** ☐ **NO** ☐

Presenta in anamnesi:

Sì NO

- ☐ ☐ Paraproteinemia di Waldenström
- ☐ ☐ Insufficienza epatica grave
- ☐ ☐ Insufficienza renale moderata/severa
- ☐ ☐ Mieloma multiplo
- ☐ ☐ Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria
- ☐ ☐ Ipertireosi
- ☐ ☐ Diabete in trattamento con Metformina
- ☐ ☐ È in corso terapia anticoagulante orale

Sì ☐	NO ☐	IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE
	Diatesi allergica	

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame con gli esiti recenti (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame) di

- **CREATININEMIA**
- **GLICEMIA**

Data

Firma del medico

N.B. La TC del torace e dell'addome va effettuata dopo almeno 2 giorni dall' esecuzione di altre indagini contrastografiche (studi radiografici dell'apparato digerente, urografie, interventistica, ecc...) e dall' esecuzione di indagini endoscopiche.

PREPARAZIONE ALL' ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO

Abbondante idratazione (almeno 1.5 litri di acqua) il giorno prima dell'esame. Digiuno per cibi solidi e liquidi da almeno 4 ore prima dell'esame.

Assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio medico di base ad esclusione di:

- Metformina che deve essere sospesa nei due giorni precedenti l'esame;
- β -bloccanti ed ACE-inibitori che devono essere sospesi il giorno dell'esame (perchè possono aggravare le ipotensioni e rendere inefficace il loro trattamento).

NOTA BENE

- si ricorda che **il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare**, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto i farmaci somministrati durante l'esame possono compromettere la guida nelle ore successive l'indagine;
- potrebbe essere prevista, dopo l'esame, una permanenza in struttura per almeno 30 minuti.