

LABORATORIO ANALISI I CEDRI - FARA NOVARESE

RACCOLTA URINE PER URINOCOLTURA

Modalità di raccolta

- Urine da mitto intermedio
- Lavare le mani con acqua e sapone (no antisettici) risciacquare e asciugare
- Lavare con cura i genitali esterni (no antisettici) e asciugare con salvietta pulita
- Aprire il contenitore sterile evitando di toccare l' interno
- Urinare: scartare nel wc la prima parte delle urine emesse
- Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte in quantita' non superiore a 3 - 4 ml
- Chiudere immediatamente il contenitore avvitando con cura il tappo per evitare eventuali fuoriuscite.

RACCOLTA URINE PER ESAME COMPLETO

Modalità di raccolta

- Raccogliere le prime urine emesse il mattino al risveglio
- Lavare le mani con acqua e sapone (no antisettici) risciacquare e asciugare
- Lavare con cura i genitali esterni (no antisettici) e asciugare con salvietta pulita
- Aprire il contenitore sterile evitando di toccare l' interno
- Urinare scartando nel wc la prima parte delle urine emesse
- Chiudere immediatamente il contenitore avvitando con cura il tappo per evitare eventuali fuoriuscite

Consegnare al laboratorio nel più breve tempo possibile.

RACCOLTA FECI

Come raccogliere il campione

Feci emesse spontaneamente:

- evacuare in un recipiente pulito ed asciutto
- per raccogliere le feci non usare la carta igienica ma l'apposita paletta in polipropilene fissata al tappo del contenitore, trasferirla nel contenitore e riavvitare accuratamente

Coprocoltura

Raccogliere le feci come sopra descritto e consegnare al laboratorio

Esame parassitologico

- Si consiglia la ricerca su almeno tre campioni raccolti in 3 giorni diversi
- Riportare su ogni campione data e ora di emissione
- Consegnare ogni campione al laboratorio entro 2-3 ore dalla raccolta

Ricerca sangue occulto

- Le feci devono essere raccolte con il cucchiaino normalmente presente nei comuni contenitori in commercio.
- È consigliabile raccogliere un campione di feci, in quantità pari ad una noce, per tre giorni consecutivi.
- Riportare su ogni campione data e ora di emissione
- I 3 campioni possono essere consegnati il 3° giorno della raccolta solo se conservati in un luogo fresco (2-8 °C).

Scotch test

- Eseguire al mattino senza aver effettuato lavaggi della parte. Utilizzare dello scotch trasparente appoggiando la parte adesiva del nastro all'orifizio anale e applicando una leggera pressione per 30 secondi.
- Stendere il nastro adesivo sulla superficie del vetrino precedentemente fornito dal laboratorio evitando la formazione di pieghe

ESPETTORATO

Procedura

- Grattare gentilmente, con spazzolino da denti o con tampone umido, la mucosa interna delle guance, le gengive e la lingua
- Sciogliere il cavo orale con acqua prima della raccolta del campione
- Espettorare in un contenitore a bocca larga sterile e con tappo a vite o nel contenitore sterile con tappo rosa in dotazione nei reparti
- Evitare l'introduzione di materiale salivare o di secrezioni nasali nel contenitore, in caso contrario ripetere l'operazione dall'inizio